



عنوان خلاصه سیاستی: برآورد اندازه سوء مصرف کنندگان الکل

محققان: علیرضا طاهری فرد، دکتر حسن احمدی نیا، دکتر محسن رضائیان، فاطمه دوست محمدی، علی فلاح

وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مرکز تحقیقات محیط کار

برآورد اندازه سوء مصرف کنندگان الکل به روش مستقیم و غیرمستقیم

اهمیت موضوع: استفاده از نوشیدنی های الکلی در بزرگسالان اغلب با طیف وسیعی از پیامدهای منفی همراه است. متانول می تواند موجب مسمومیت و حتی مرگ شود. استفاده از مشروبات الکلی به مقدار زیاد و طولانی مدت، منجر به اعتیاد به الکل و آسیب دائمی به ارگان های اصلی بدن خصوصاً مغز، کبد و قلب می شود.

روش کار: مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۸ انجام شد. از روش بسط شبکه ای و مستقیم، جمع آوری داده ها انجام شد.

یافته ها: در این تحقیق ۸۷۶ نفر از گروه های سنی ۱۵-۷۷ سال شهر رفسنجان شرکت نمودند. مصرف مشروبات الکلی در روش مستقیم برای جمعیت عمومی ۱۳ درصد بود (۲۲/۲ درصد برای مردان و ۴/۴ درصد برای زنان). در حالیکه این مقادیر برای اندازه گیری روش غیرمستقیم در بین مردان برابر ۲۶/۵ درصد و زنان ۸/۳ درصد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادات: مصرف نوشیدنی های الکلی در جمعیت عمومی با اندازه گیری غیرمستقیم حدود ۱۷ درصد می باشد. لذا با توجه به شیوع بالای مصرف مشروبات الکلی در مردان، ممکن است خطر مسمومیت ناخواسته با متانول افزایش یابد.

منابع و منابع بیشتر برای مطالعه

مقاله

Prevalence of alcoholic beverage consumption among a population with a history of methanol poisoning in the southeast of Iran

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14659891.2024.2389272>

تضاد منافع: ندارد

پیوست: مقاله مستخرج از طرح در عنوان هایپر لینک فوق